



# HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ

Cervino 3354 - (1425) - Capital Federal - Argentina

## APERTURA SALA TOXICOLOGIA

Detoxification unit opening

Cortese, Silvia Cristina; Damin, Carlos Fabián Hospital Juan A. Fernández, División Toxicología Cervino 3356 48082655/48017767 [dra.s.cortese@gmail.com](mailto:dra.s.cortese@gmail.com)

### OBJETIVO

Comunicar la apertura de la sala de toxicología., presentación del manual de procedimientos (objetivos y funcionamiento) y datos estadísticos preliminares.

### OBJETIVO DE LA SALA EN UID

- Ayudar al paciente a disminuir el consumo de las sustancias o alcanzar la abstinencia completa.

Objetivo de máxima: **abstinencia** ( se asocia a mejores resultados a largo plazo) REMISION COMPLETA

Objetivo de mínima: **Consumo controlado** ( asociado a disminución de la morbilidad) REMISION PARCIAL

- Ayudar al paciente a disminuir frecuencia y gravedad de los episodios de consumo.
- Mejorar el funcionamiento psicológico, social y laboral.

### MODALIDAD DE INGRESO

- Demanda espontánea
- Derivación de pacientes en tratamiento ambulatorio en la División Toxicología
- Derivación de guardia u otro servicio del hospital
- Derivación de otros efectores de salud y/o Desarrollo Social
- Derivación Judicial

### MODALIDAD DE EGRESO

- Alta medica a tratamiento ambulatorio en la División Toxicología del hospital
- Alta medica a tratamiento de internacion crónica por UID
- Alta medica a domicilio por resolución de la causa que motivo su internacion y no requiere de seguimiento

### MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

La elaboración de un manual de procedimientos que involucra a todos los intervinientes en la sala.

Se definen las funciones de cada participante del equipo residentes, médicos de planta, médicos de guardia, enfermería, licenciados en psicología y psiquiatras.

Se plantean objetivos a un año del inicio de la tarea, respecto a investigación.

Dentro del manual de procedimientos se establecieron sistemáticas de tratamiento y scores de evaluación de gravedad (abstinencia alcohólica y a opiáceos) fin de establecer requerimiento de fármacos.

#### Organizar la tarea

#### Definir funciones de cada integrante

#### Planificar tareas de investigación

#### Elaborar indicadores de calidad

SIGNOS SINTOMAS	0	1	2	3	4	5	TOTAL
FRECUENCIA CARDIACA	≤80	81 A 100	101 A 120	>120			
SUDORACION	NO REPORTA	SUBJETIVIDAD DE ESCALOFRIOS O SOFOCOS OBJETIVABLES	ESCALOFRIOS O SOFOCOS OBJETIVABLES	SUDORACION EN FRENTE O BRAZOS	SUDORACION PROFUSA EN CARA		
INQUIETUD O DEBASOCIEGO	NO REPORTA	PUEDE QUEDARSE QUIETO	FRECUENTES MOVIMIENTOS DE PIERNAS Y BRAZOS			INQUIETUD PERMANENTE	
PUPILAS	NORMALES	RESPUESTA PUPILAR LENTA	MODERADA MORIASIS			MORIASIS MAXIMA	
DOLOR OSEOARTICULACIONES	NO	LEVE, DIFUSO	DOLOR DIFUSO GRAVE EN ARTICULACIONES Y MUSCULOS			PACIENTE INQUIETO POR DOLOR	
GOTE NASALLAGRIMO	NO	CONGESTION NASAL OCULAR	CONGESTION NASALLAGRIMO			NARIZ GOTEANDO CONTINUAMENTE LAGRIMO CONTINUO	
MALESTAR		CALAMBRES	NAUSEAS O VOMITOS/DIARR			EPISODIOS MULTIPLES DE DIARREA Y	
TEMBLOR	NO	EL TEMBLOR PUEDE SER SENTIDO PERO NO OBSERVADO	TEMBLOR LEVE			TEMBLOR GRUPEO ESPASMOS MUSCULARES	
BOSTEZO	NO	1-2 VECES	3 O MAS VECES			3 VARIAS VECES POR MINUTO	
ANSIEDAD/IRRITABILIDAD	NO	REFERE IRRITABILIDAD/ANSIEDAD	IRRITABLE/ANSIOSO			LA IRRITABILIDAD/ANSIEDAD DIFICULTA LA EVALUACION	
PILOERRECCION	NO		SE PALPA			PROMINENTE	

### TRABAJOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO


- 1.Imágenes cerebrales en dependientes a PACO
- 2.Perfil endocrinológico en dependientes a drogas de abuso
- 3.Exposición a drogas de abuso intrauterino
- 4.Ecodopler cardíaco en pacientes dependientes a cocaína
- 5.Ecodopler de vasos de cuello, medición de la íntima, en dependientes a cocaína
- 6.Evaluación de nuevos fármacos en la abstinencia alcohólica

### CRITERIOS DE ADMISIÓN


- Pacientes adultos o mayores de 14 años (con familiar o dispositivo de inclusión a cargo de Desarrollo Social)
- Pacientes con Síndromes de Abstinencia o Cuadros de Sobredosis a Drogas de abuso de curso legal o ilegal que no requieran de alta complejidad
- Pacientes con alto consumo de sustancias que manifiestan el deseo de interrumpir el mismo y que no logran sostener la abstinencia en el tratamiento ambulatorio.
- Pacientes con patología toxicológica de urgencia y programada, que se encuentren en condiciones de internacion en piso.
- Pacientes internados en la sala por otros servicios con seguimiento por la especialidad correspondiente.

### CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Patologías graves con conductas disruptivas, de riesgo suicida que requieran de dispositivos psiquiátricos convencionales de atención.
- Pacientes con comorbilidad psiquiátrica manifiesta de alto riesgo
- Pacientes que requieran monitoreo cardiológico continuo o compromiso de la vía aérea.
- Paciente que se retiró sin alta medica o con alta disciplinaria



DISTRIBUCION POR DIAS INTERNACION  
**MEDIA 6,24 DIAS**  
**MEDIANA 5 DIAS**



**MEDIA 27,25 AÑOS**  
**MEDIANA 26 AÑOS**

