



REPORTE ESTADISTICO SALA TOXICOLOGIA STATISTICAL REPORT TOXICOLOGY

Cortese, Silvia C; Gomez Maria E; Risso Marina; Damin Carlos; Traverso Constanza; Cortez Analia; Di Nardo Victoria; Trapassi Horacio; Borrás Mirta
Hospital Juan A. Fernandez. Cerviño 3356. 541148082655.




Las tasas de recaídas para los pacientes con problemas de drogadicción son comparables con las de aquellos que sufren de diabetes, hipertensión arterial y asma. La recaída es común y similar para estas enfermedades (al igual que lo es la adherencia a los medicamentos). Por lo tanto, la drogadicción debe tratarse al igual que cualquier otra enfermedad crónica, siendo la recaída una señal para renovar la intervención. (Nora D. Volkow . NIDA Director)

Se internaron un promedio de 16 pacientes por mes (192 al año)

X internación en la sala fue 7,6 días

Total de pacientes internados en Sala de Desintoxicación en el 1° año.




Mediana edad 31 años

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO


Ayudar al paciente a disminuir el consumo de las sustancias o alcanzar la abstinencia completa.

- Objetivo de máxima: **abstinencia** (se asocia a mejores resultados a largo plazo) **REMISION COMPLETA**
- Objetivo de mínima: **Consumo controlado** (asociado a disminución de la morbilidad) **REMISION PARCIAL**

Pacientes internados por edad en sala de Desintoxicación en el 1° año.



Pacientes internados por tipo de droga en sala de Desintoxicación en el 1° año.



Otras intoxicaciones

- Agudas 11 (cáusticos, hidrocarburos aromáticos, glicoles, isoniazida, MDMA, monóxido, paracetamol)
- Crónica 1 (plomo).

Pacientes internados situación habitacional y tipo de droga

Del total de pacientes internados, 78 se encontraban en situación de calle.

La droga dominante en este grupo fue el alcohol y el PACO.

Destino del paciente al alta luego de la Desintoxicación



TRABAJOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO y PRESENTADOS

1. Imágenes cerebrales en dependientes a PACO
2. Perfil endocrinológico en dependientes a drogas de abuso
3. Exposición a drogas de abuso intrauterina
4. Ecodopler cardíaco en pacientes dependientes a cocaína
5. Ecodopler transcraneano en dependientes a cocaína
6. Evaluación de nuevos fármacos en la abstinencia alcohólica
7. Determinación de colinesterasas séricas en dependientes a cocaína
8. Determinación de AAS en dependientes a cocaína
9. Evaluación de CIWAR en alcohólicos internados en Sala de Toxicología